

РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2706/71 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 1971 година

относно метода за определяне на пероксидазата в някои продукти от преработени зърнени култури

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 120/67 на Съвета относно общата организация на пазара на зърнените култури¹, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1550/71² и по-специално член 16, параграф 6,

като има предвид, че при експортната субсидия трябва да се държи сметка за качеството на преработения зърнен продукт, за който е отпусната тази субсидия, така че да се избегне изразходването на обществени средства за износа на продукти с ниско качество; като има предвид, че за тази цел е необходимо в някои продукти от преработени зърнени култури пероксидазата да бъде направена практически неактивна; като има предвид, че за да се гарантира еднаквото приложение на разпоредбите за отпускане на експортни субсидии за продуктите, които отговарят на това изискване, следва да се предвиди общностен метод за определяне активността на пероксидазата;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за зърнени култури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Когато за отпускането на експортна субсидия за някои продукти от преработени зърнени култури се изисква пероксидазата да бъде направена практически неактивна, проверката за това се извършва по метода, описан в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 1971 година.

За Комисията

Председател

Franco M. MALFATTI

¹ ОВ 117, 19.6.1967 г., стр. 2269/67.

² ОВ L 164, 22.7.1971 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Метод за определяне активността на пероксидазата

В хаван се стриват 5 г проба с малко дестилирана вода. Сместа се пресипва в градуирана колба с обем 100 мл и се допълва с дестилирана вода до марката. Сместа се оставя да престои в продължение на 30 минути и се филтрира с нагънат филтър.

5 мл от избистрения разтвор се пресипват с пипета в епруетка. Добавят се 1 мл 10 % разтвор от кристален гваякол и 96 % етанол, както и 1 мл 1% H_2O_2 (водороден прекис). Двата реактивни разтвора трябва да бъдат прясно приготвени. Проверява се концентрацията на разтвора на водородния прекис. След половин час не трябва да има промяна в оцветяването или да се появи само леко оцветяване в кафяво-червено спрямо паралелно проведен празен тест.

.

Тестът за оцветяването се провежда два пъти.