

ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА КОМИСИЯТА

от 18 април 1978 година

**за изменение на приложенията към Директива 66/401/ЕИО относно
търговията със семена от фуражни култури**

(78/ 386/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 66/ 401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури¹, последно изменена с Директива 78/55/ЕИО², и по-специално член 21а от нея,

като има предвид, че в светлината на развитието на научните и технически познания, приложения I, II и III към директивата следва да бъдат изменени поради изброените по-долу съображения;

като има предвид, че, за да бъде подобрена генетичната стойност на семената, трябва да се предвидят стандарти за сортова чистота, на които трябва да отговаря културата за определени видове;

като има предвид, че в тази връзка, по отношение на самооплождащи се видове и апомиктични моноклонни сортове на *Poa spp.*, следва да се предвидят условия за стандартите за сортова чистота, на която трябва да отговарят семената;

като има предвид, че трябва да бъдат предвидени условията, на които трябва да отговаря културата по отношение на наличието на вредни организми, които намаляват полезността на семето;

като има предвид, че следва да бъдат определени специални стандарти по отношение на максималното съдържание на други нежелателни или вредни семена като *Agropyron repens*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis*, *Melilotus spp.*, *Sinapis arvensis*, *Raphanus raphanistrum* или видовете *Rumex* освен *Rumex acetosella*, *Rumex crispus* и *Rumex obtusifolius*;

¹ ОВ 125, 11.7.1996 г., стр. 2298/66.

² ОВ L 16, 20.1.1978 г., стр. 23.

като има предвид, че стандартите по отношение на минималната кълняемост и минималната аналитична чистота трябва да бъдат приведени в съответствие с развитието на качеството, обичайно достигнато от семената;

като има предвид, че за да бъдат удовлетворени условията за официалната инспекция на семената, извършвана в съответствие с настоящите международни методи, е необходимо да бъдат преразгледани някои разпоредби;

като има предвид, че предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по посевен и посадъчен материал за земеделието, цветарството и горското стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 66/401/ЕИО се изменя както следва:

1. Текстът на приложение I се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КУЛТУРАТА

1. Предходните отгледани култури на полето не трябва да са били несъвместими с производството на семена от видовете и сорта на културата и полето трябва да бъде достатъчно чисто от саморасли насаждения от предходните култури.

2. Културата трябва да отговаря на следните стандарти по отношение на разстоянията от съседни източници на полен, което може да доведе до нежелателно кръстосано опрашване:

Култура	Минимално разстояние
1	2
Brassica spp	
За производството на базови семена	400 m
- За производството на сертифицирани семена	200 m
Видове или сортове, различни от Brassica, Pisum arvense апомиктични моноклонни сортове на Poa	
За производството на семена, предназначени за размножаване, площи до 2 ha	200 m
За производството на семена, предназначени за размножаване, площи над 2 ha	100 m
За производството на семена, предназначени за производството на фуражни растения, площи до 2 ha	100 m
За производството на семена, предназначени за производството на фуражни растения, площи над 2 ha	50 m

Тези разстояния могат да бъдат пренебрегнати, в случай че има достатъчна защита срещу всякакво нежелателно кръстосано опрашване.

3. Растенията от други видове, чиито семена трудно могат да бъдат различени от семената на културата при лабораторно изпитване се допускат само в малко количество.

В частност, култури от вида *lolium* трябва да отговарят на следните условия: броят на растенията от вида *lolium*, различни от видовете на дадената култура, не трябва да надхвърлят:

- едно на 50 m² за производство на базови семена,
- едно на 10 m² за производството на сертифицирани семена;

4. Културата трябва да има достатъчна сортова автентичност и чистота. В частност, култури от други видове или освен *Pisum arvense* или апомиктичните моноклонни сортове на *Poa spp.*, трябва да отговарят на следните стандарти:

броят на растенията от вида култура, които могат да бъдат разпознати като явно непринадлежащи на дадения сорт, не трябва да надхвърлят:

- едно на 30 m² за производството на базови семена,
- едно на 10 m² за производство на сертифицирани семена.

5. Вредните организми които намаляват полезността на семената, трябва да бъдат на възможно най-ниско ниво.

6. Изпълнението на посочените по-горе стандарти или други условия се установява при официални полеви инспекции.

Тези полеви инспекции се извършват в съответствие със следните изисквания:

А. Състоянието и фазата на развитие на растението позволяват съответната проверка.

Б. Провежда се поне една полева инспекция.

В. Размерът, броят и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани, за да се провери изпълнението на условията на настоящото приложение се определят съгласно съответните методи."

2. Текстът на приложение II се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СЕМЕНАТА

I. СЕРТИФИЦИРАНИ СЕМЕНА

1 Семената трябва да притежават задоволителна сортова идентичност и чистота. По-специално, семената на *Pisum arvense* и апомиктичните моноклонни сортове на вида *Poa spp.*, съответстват на следните стандарти или други изисквания: минималната сортова чистота на сорта е 98 %.

Минималната сортова чистота се контролира главно по време на полевите инспекции, провеждани в съответствие с условията, изложени в приложение I.

2. Семената отговарят на следните стандарти или други изисквания по отношение на кълняемостта, аналитичната чистота и съдържанието на семена от други растителни видове, включително и семена от лупина с друг цвят и горчиви семена от лупина.

А. Таблица.

Видове	Кълняемост		Аналитична честота	
	Минимал на кълняемос	Максимал но съдържан	Минимална аналитична чистота (%)	Максимално съдържание на семена от други растения (% тегловни)

	т (% от чисти семена)	ие от твърдо семе (% от чисти семена)	тегловни)	Общо	Само един вид	Agropyron repens
1	2	3	4	5	6	7
GRAMINAE						
Agrostis canina ssp. canina	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis gigantea	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis stolonifera	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Agrostis tenuis	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3
Alopecurus pratensis	70 (a)		75	2,5	1,0	0,3
Arrhenatherum elatius	75 (a)		90	3,0	1,0 (д)	0,5
Dactylis glomerata	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3
Festuca arundinacea	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca ovina	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5
Festuca pratensis	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5
Festuca rubra	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5
Lolium multiflorum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium perenne	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Lolium X hybridum	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5
Phleum bertolonii	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Phleum pratense	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3
Poa annua	75 (a)		85	2,0 (в)	1,0 (в)	0,3
Poa nemoralis	75 (a)		85	2,0 (в)	1,0 (в)	0,3
Poa palustris	75 (a)		85	2,0 (в)	1,0 (в)	0,3
Poa pratensis	75 (a)		85	2,0 (в)	1,0 (в)	0,3
Poa trivialis	75 (a)		85	2,0 (в)	1,0 (в)	0,3
Trisetum flavescens	70 (a)		75	3,0	1,0 (в)	0,3
LEGUMINOSAE						
Hedysarum coronarium	75 (a) (б)	30	95	2,5	1,0	
Lotus corniculatus	75 (a) (б)	40	95	1,8 (д)	1,0 (д)	
Lupinus albus	80 (a) (б)	20	98	0,5 (д)	0,3 (д)	
Lupinus angustifolius	75 (a) (б)	20	98	0,5 (д)	0,3 (д)	
Lupinus luteus	80 (a) (б)	20	98	0,5 (д)	0,3 (д)	
Medicago lupulina	80 (a) (б)	20	97	1,5	1,0	
Medicago sativa	80 (a) (б)	40	97	1,5	1,0	
Medicago varia	80 (a) (б)	40	97	1,5	1,0	
Onobrychis sativa	75 (a) (б)	20	95	2,5	1,0	
Pisum arvense	80 (a)		98	0,5	0,3	
Trifolium alexandrinum	80 (a) (б)	20	97	1,5	1,0	

Trifolium hybridum	80 (a) (б)	20	97	1,5	1,0
Trifolium incarnatum	75 (a) (б)	20	97	1,5	1,0
Trifolium pratense	80 (a) (б)	20	97	1,5	1,0
Trifolium repens	80 (a) (б)	20	97	1,5	1,0
Trifolium resupinatum	80 (a) (б)	20	97	1,5	1,0
Trigonella foenumgraecum	80 (a)		95	1,0	0,5
Vicia faba ssp. var. cquina	85 (a) (б)	5	98	0,5	0,3
Vicia faba var. minor	85 (a) (б)	5	98	0,5	0,3
Vicia pannonica	85 (a) (б)	20	98	1,0 (д)	0,5 (д)
Vicia sativa	85 (a) (б)	20	98	1,0 (д)	0,5 (д)
Vicia villosa	85 (a) (б)	20	98	1,0 (д)	0,5 (д)
ДРУГИ ВИДОВЕ					
Brassica napus var. napobrassica	80 (a)		98	1,0	0,5
Brassica oleracea convar. acephala	75 (a)		98	1,0	0,5
Raphans sativus ssp. oleifera	80 (a)		97	1,0	0,5

Аналитична чистота				Максимална чистота на други растителни видове в проба с теглото, указано в колона 4 на приложение III (общо на колона)	Условия по отношение на семена от лупина от друг цвят и на семена от горчица лупин		
Максимално съдържание на семена от други растения (% тегловни)							
Alopecurus mysuroides	Melilotus sp.p.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis	Cuscuta sp.p.	Rumex sp.p. altul decât Rumex acetosella	
8	9	10	11	12	13	14	15
0,3				0	0 (й) (к)	2	
0,3				0	0 (й) (к)	2	

0,3		0	0 (й) (к)	2	
0,3		0	0 (й) (к)	2	
0,3		0	0 (й) (к)	10	
0,3		0 (ж)	0 (й) (к)	20	
0,3		0	0 (й) (к)	10	
0,3		0	0 (й) (к)	20	
0,3		0	0 (й) (к)	10	
0,3		0	0 (й) (к)	20	
0,3		0	0 (й) (к)	10	
0,3		0	0 (й) (к)	20	
0,3		0	0 (й) (к)	20	
0,3		0	0 (й) (к)	20	
0,3		0	0 (к)	5	
0,3		0	0 (к)	5	
0,3		0	0 (й) (к)	5	
0,3		0	0 (й) (к)	2	
0,3		0	0 (й) (к)	2	
0,3		0	0 (й) (к)	2	
0,3		0	0 (й) (к)	2	
0,3		0 (з)	0 (й) (к)	2	
	0,3	0	0 (к)	20	
	0,3	0	0 (л) (м)	10	
	0,3	0 (и)	0 (й)	20 (н)	(о) (п)
	0,3	0 (и)	0 (й)	20 (н)	(о) (п)
	0,3	0 (и)	0 (й)	20 (н)	(о) (п)

0,3			0	0 (л) (м)	20
0,3			0	0 (л) (м)	20
0,3			0	0 (л) (м)	20
0,3			0	0 (й)	20
0,3			0	0 (й)	20 (н)
0,3			0	0 (л) (м)	20
0,3			0	0 (л) (м)	10
0,3			0	0 (л) (м)	20
0,3			0	0 (л) (м)	20
0,3			0	0 (л) (м)	10
0,3			0	0 (л) (м)	10
0,3			0	0 (й)	20
0,3			0	0 (й)	20 (н)
0,3			0	0 (й)	20 (н)
0,3			0 (и)	0 (й)	20 (н)
0,3			0 (и)	0 (й)	20 (н)
0,3			0 (и)	0 (й)	20 (н)
	0,3	0,3	0	0 (й) (к)	20
	0,3	0,3	0	0 (й) (к)	20
	0,3	0,3	0	0 (й) (к)	20

Б. Стандарти или други изисквания, които се прилагат в случай на позоваване в таблицата към раздел I, точка 2, буква А на настоящото приложение

а) всички свежи и здрави семена, които не са покълнали след предварително третиране се считат за семена, които са покълнали.

б) До максимално посоченото количество, наличните твърди семена, се считат за семена, които могат да покълнат.

в) Общо максимално съдържание 0, 8% тегловно на семена от други видове Роа не се счита за примес.

г) Максимално съдържание 1% тегловно на семена от вида *Trifolium pratense* не се счита за примес.

д) Общо максимално съдържание 0,5% тегловни на семена от вида *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum arvense*, *Vicia faba* spp., *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* при други съответни видове не се счита за примес.

е) Препоръчаното максимално процентно съдържание в тегловно изражение на семена от отделен тип не се прилага за семена от *Poa* spp.

ж) Максимално две семена от *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* в проба с предписаното тегло не се счита за примес, когато има втора проба със същото тегло без семена от тези видове.

з) Наличието на едно семе от типа *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* в проба от предписаното тегло не се счита за примес, когато има втора проба с двойно на предписаното тегло без семена от тези видове.

и) Определянето на семената от *Avena fatua*, *Avena ludoviciana*, *Avena sterilis* по брой не трябва да се извършва, освен ако има съмнение дали са били изпълнени изискванията от колона 12.

й) Определянето по брой на семената от *Cuscuta* spp., не трябва да се извършва, освен ако има съмнение дали са били изпълнени изискванията от колона 13.

к) Наличието на едно семе от *Cuscuta* spp., в проба с предписаното тегло не се счита за примес, когато има втора проба със същото тегло без семена от *Cuscuta* spp.

л) Теглото на пробата за определянето на семената от *Cuscuta* spp., по брой е два пъти теглото, посочено в колона 4 на приложение III за съответните видове.

м) Наличието на едно семе от типа *Cuscuta* spp. в проба с предписаното тегло не се счита за примес, когато има втора проба с тегло два пъти колкото предписаното, без семена от *Cuscuta* spp.,

н) Не е необходимо да се извършва определяне по брой на семена от *Rumex* с изключение на семена от *Rumex acetosella*, освен ако има съмнения, че са били изпълнени изискванията от колона 14.

о) Процентното съдържание по брой на семена от лупина от друг цвят, не трябва да надвишава:

- | | |
|--|-----|
| - в горчива лупина | 2% |
| - в лупини, различни от горчива лупина | 1%. |

п) Процентното съдържание по брой на семена от горчива лупина в други сортове освен горчива лупина не трябва да надвишава:

- за сертифицирани семена от първо поколение

-

след базови семена 3%

- за сертифицирани семена от следващи поколения,

-

след базови семена 5%

3. Вредните организми, които намаляват полезността на семето, трябва да бъдат на възможно най-ниско равнище.

II. БАЗОВИ СЕМЕНА

При спазване на посочените по-долу разпоредби, условията в раздел I на настоящото приложение се прилагат за базови семена:

1. Семената от *Pisum arvense* и апомиктичните моноклонни сортове на вида *Poa spp.*, трябва да отговарят на следните стандарти или други изисквания: минималната сортова чистота е 99,7 %.

Минималната сортова чистота се проверява главно при полеви инспекции, извършвани в съответствие с условията, изложени в приложение I.

2. Семената трябва да отговарят на следните стандарти или други изисквания:

А. Таблица:

Видове	Максимално съдържание на семена от други растения						Други стандарти и или условия
	Общо (% тегловно)	Съдържание по брой в проба с тегло, посочено в колона 4 на приложение III (общо на колона)					
		Само един вид	Rumex spp., освен Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecuru myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8

Видове	Максимално съдържание на семена от други растения						Други стандарти и или условия
	Общо (% тегловно)	Съдържание по брой в проба с тегло, посочено в колона 4 на приложение III (общо на колона)					
		Само един вид	Rumex spp., освен Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecuru myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
GRAMINEAE							
Agrostis canina ssp. canina	0,3	20	1	1	1		(й)
Agrostis gigantea Roth.	0,3	20	1	1	1		(й)
Agrostis stolonifera	0,3	20	1	1	1		(й)
Agrostis tenuis	0,3	20	1	1	1		(й)
Alopecurus pratensis	0,3	20(a)	5	5	5		(й)
Arrhenatherum elatius	0,3	20(a)	5	5	5		(й) (й)
Dactylis glomerata	0,3	20(a)	5	5	5		(й)
Festuca arundinacea	0,3	20(a)	5	5	5		(й)
Festuca ovina	0,3	20(a)	5	5	5		(й)
Festuca pratensis	0,3	20(a)	5	5	5		(й)
Festuca rubra	0,3	20(a)	5	5	5		(й)

Видове	Максимално съдържание на семена от други растения						Други стандарти и или условия
	Общо (% тегловно)	Съдържание по брой в проба с тегло, посочено в колона 4 на приложение III (общо на колона)					
		Само един вид	Rumex spp., освен Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecuru myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Lolium multiflorum	0,3	20(а)	5	5	5		(й)
Lolium perenne	0,3	20(а)	5	5	5		(й)
Lolium x hybridum	0,3	20(а)	5	5	5		(й)
Phleum bertolonii	0,3	20	2	1	1		(й)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1		(й)
Poa annua	0,3	20(б)	1	1	1		(е) (й)
Poa nemoralis	0,3	20(б)	1	1	1		(е) (й)
Poa palustris	0,3	20(б)	1	1	1		(е) (й)
Poa pratensis	0,3	20(б)	1	1	1		(е) (й)
Poa trivialis	0,3	20(б)	1	1	1		(е) (й)
Trisetum flavescens	0,3	20(в)	1	1	1		(и) (й)

Видове	Максимално съдържание на семена от други растения						Други стандарты и или условия
	Общо (% тегловно)	Съдържание по брой в проба с тегло, посочено в колона 4 на приложение III (общо на колона)					
		Само един вид	Rumex spp., освен Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecuru myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
LEGUMINOSAE							
Hedysarum coronarium	0,3	20	5			0(д)	(й)
Lotus corniculatus	0,3	20	5			0(д)	(ж) (й)
Lupinus albus	0,3	20	5			0(г)	(з) (к)
Lupinus angustifolius	0,3	20	5			0(г)	(з) (к)
Lupinus luteus	0,3	20	5			0(г)	(з) (к)
Medicago lupulina	0,3	20	5			0(д)	(й)
Medicago sativa	0,3	20	5			0(д)	(йj)
Medicago varia	0,3	20	5			0(д)	(й)
Onobrychis sativa	0,3	20	5			0(г)	
Pisum arvense	0,3	20	5			0(г)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	5			0(д)	(й)

Видове	Максимално съдържание на семена от други растения						Други стандарти и или условия
	Общо (%) тегловно)	Съдържание по брой в проба с тегло, посочено в колона 4 на приложение III (общо на колона)					
		Само един вид	Rumex spp., освен Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecuru myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Trifolium hybridum	0,3	20	5			0(д)	(й)
Trifolium incarnatum	0,3	20	5			0(д)	(й)
Trifolium pratense	0,3	20	5			0(д)	(й)
Trifolium repens	0,3	20	5			0(д)	(й)
Trifolium resupinatum	0,3	20	5			0(д)	(й)
Trigonella foenumgraecum	0,3	20	5			0(г)	
Vicia faba ssp. var. equina	0,3	20	5			0(г)	
Vicia faba var. minor	0,3	20	5			0(г)	
Vicia pannonica	0,3	20	5			0(г)	(з)
Vicia sativa	0,3	20	5			0(г)	(з)
Vicia villosa	0,3	20	5			0(г)	(з)

Видове	Максимално съдържание на семена от други растения						Други стандарти и или условия
	Общо (%) тегловно)	Съдържание по брой в проба с тегло, посочено в колона 4 на приложение III (общо на колона)					
		Само един вид	Rumex spp., освен Rumex acetosella	Agropyron repens	Alopecuru myosuroides	Melilotus spp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
ДРУГИ ВИДОВЕ							
Brassica napus var.	0,3	20	5				(е)
napobrassica	0,3	20	5				(й)
Brassica oleracea convar. acephala	0,3	20	5				
Raphanus sativus ssp. oleifera							

Б. Стандартните или други изисквания, които се прилагат при позоваване в таблицата по раздел II, точка 2, буква А на настоящото приложение:

а) Максимално количество от общо 80 семена от *Poa spp.*, не се счита за примес.

б) Посоченото в колона 3 условие не се прилага за семената от *Poa spp.*, максималното общо съдържание на семена от *Poa spp.*, освен видовете, които ще бъдат преглеждани, не трябва да надвишава едно при проба от 500 семена.

в) Максимално общо количество от 20 семена от *Poa spp.*, не се счита за примес.

г) Определянето на семена от типа *Melilotus spp.*, не трябва да се извършва, освен ако има съмнение, че са били изпълнени изискванията, посочени в колона 7.

д) Наличието на едно семе от *Melilotus spp.*, в проба с предписаното тегло, не се счита за примес, когато има втора проба с тегло два пъти колкото предписаното която е без семена от *Melilotus spp.*

е) Изискването по буква в), посочено в раздел I, точка 2 на настоящото приложение не се прилага.

ж) Изискването по буква г) от раздел I, точка 2 на настоящото приложение не се прилага.

з) Изискването по буква д) от раздел I точка 2 на настоящото приложение не се прилага.

и) Изискването по буква е) от раздел I точка 2 на настоящото приложение не се прилага.

й) Изискванията по букви е) и м) от раздел I, точка 2 на настоящото приложение не се прилагат.

к) Процентното съдържание по брой на семена от горчива лупина при други сортове, освен типа горчива лупина, не трябва да надхвърля 1 %.

III. ТЪРГОВСКИ СЕМЕНА

При спазване на посочените по-долу разпоредби, условията, посочени в раздел I, точки 2 и 3 от настоящото приложение се прилагат за търговски семена:

1. Процентите на теглото, изложени в колони 5 и 6 на таблицата от раздел I, точка 2, буква А на настоящото приложение се увеличават с 1 %.

2. За *Poa annua* максимално общо съдържание от 10% тегловно семена от други видове *Poa* не се счита за примес.

3. За видове *Poa spp.* различни от *Poa annua* максимално общо съдържание от 3% тегловно на семената от другите видове *Poa* няма да се счита за примес.

4. За *Hedisarum coronarium* максимално общо съдържание от 1% тегловно на семената от *Melilotus spp.* не се счита за примес.

5. Условието по буква е) от раздел I, точка 2 на настоящото приложение за *Lotus corniculatus* не се прилага.

6. За видовете лупина: (а) минималната аналитична чистота е 97% от теглото;

б) процентното съдържание по брой семена лупина от друг цвят няма да надхвърля:

- в горчива лупина 4%

- в лупини, различни от горчива лупина 2%.

в) процентът по брой семена от горчива лупина

в лупина, различна от горчива лупина не трябва да надхвърля 5 %

7. При *Vicia spp.* максимално общо тегло от 6% на семената от типа *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* или свързани с тях култивирани видове в другите съответни видове не се счита за наличие на примес.

8. При *Vicia pannonica*, *Vicia sativa*, *Vicia villosa* минималната аналитична чистота е 97% според теглото."

3. Приложение III да се чете както следва:

" ПРИЛОЖЕНИЕ III
ТЕГЛО НА ПАРТИДИ И ПРОБИ

Видове	Максимално тегло на проба (тонове)	Минимално тегло на проба, която се взема от партидата (в грамове)	Тегло на пробата за определяне по брой, предвидено в колона от 12 до 14 на приложение II, раздел I, точка 2, буква А и колони от 3 до 7 на приложение II, раздел III, точка 2, буква А (в грамове)
1	2	3	4

Видове	Максимално тегло на проба (тонове)	Минимално тегло на проба, която се взема от партидата (в грамове)	Тегло на пробата за определяне по брой, предвидено в колона от 12 до 14 на приложение II, раздел I, точка 2, буква А и колони от 3 до 7 на приложение II, раздел III, точка 2, буква А (в грамове)
1	2	3	4
GRAMINEAE			
<i>Agrostis canina</i> ssp. <i>canina</i>	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i> Roth.	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i>	10	50	5
<i>Agrostis tenuis</i>	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i>	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i>	10	200	80
<i>Dactylis glomerata</i>	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i>	10	100	50
<i>Festuca ovina</i>	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i>	10	100	50
<i>Festuca rubra</i>	10	100	30
<i>Lolium multiflorum</i>	10	200	60
<i>Lolium perenne</i>	10	200	60
<i>Lolium x hybridum</i>	10	200	60
<i>Phleum bertolonii</i>	10	50	10
<i>Phleum pratense</i>	10	50	10
<i>Poa annua</i>	10	50	10
<i>Poa nemoralis</i>	10	50	5
<i>Poa palustris</i>	10	50	5
<i>Poa pratensis</i>	10	50	5
<i>Poa trivialis</i>	10	50	5
<i>Trisetum flavescens</i>	10	50	5
LEGUMINOSAE			
<i>Hedysarum coronarium</i>			
- плод	10	1 000	300
- семена	10	400	120
<i>Lotus corniculatus</i>	10	200	30
<i>Lupinus albus</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus angustifolius</i>	20	1 000	1 000
<i>Lupinus luteus</i>	20	1 000	1 000
<i>Medicago lupulina</i>	10	300	50

Видове	Максимално тегло на проба (тонове)	Минимално тегло на проба, която се взема от партидата (в грамове)	Тегло на пробата за определяне по брой, предвидено в колона от 12 до 14 на приложение II, раздел I, точка 2, буква А и колони от 3 до 7 на приложение II, раздел III, точка 2, буква А (в грамове)
1	2	3	4
Medicago sativa	10	300	50
Medicago varia	10	300	50
Onobrychis sativa			
- плод	10	600	600
- семена	10	400	400
Pisum arvense	20	1 000	1 000
Trifolium alexandrinum	10	400	60
Trifolium hybridum	10	200	20
Trifolium incarnatum	10	500	80
Trifolium pratense	10	300	50
Trifolium repens	10	200	20
Trifolium resupinatum	10	200	20
Trigonella foenumgraecum	10	500	450
Vicia faba ssp. var. equina	20	1 000	1 000
Vicia faba var. minor	20	1 000	1 000
Vicia pannonica	20	1 000	1 000
Vicia sativa	20	1 000	1 000
Vicia villosa	20	1 000	1 000
ДРУГИ ВИДОВЕ			
Brassica napus var. napobrassica			
Brassica oleracea convar. acephala			
Raphanus sativus ssp. oleifera			
	10	200	100
	10	200	100
	10	300	300”

Член 2

1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими да се съобразят с:

- на 1 януари 1981 г., разпоредбите на член 1, параграф 1 по отношение на приложение I, точки 3 и 4, член 1 точка 2, по отношение на приложение II, раздел I, точка 1, и приложение II, раздел II, точка 1,

- другите разпоредби на настоящата директива, не по-късно от 1 юли 1980 г.

2. Държавите-членки гарантират, че семената от фуражни култури не са обект на никакви търговски ограничения поради различните дати на прилагане на настоящата директива, в съответствие с второто тире на параграф 1.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 април 1978 година.

За Комисията
Finn GUNDELACH
Заместни -председател