

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 март 1995 година

относно определяне на критериите за изследване за откриване на нюкясълска болест у домашните птици с произход от контролираните зони, предназначени за клане, при прилагане на член 5, параграф 3 от Директива 91/494/ЕИО на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

(95/117/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/494/ЕИО на Съвета от 26 юни 1991 г. относно здравните условия за животните, регулиращи търговията вътре в Общността и вноса от трети страни на прясно птиче месо ¹, последно изменена с Директива 93/121/ЕО ², и по-специално член 5, параграф 3 от нея,

като има предвид, че в приложение на разпоредбите на член 5, параграф 3 от Директива 91/494/ЕИО, е необходимо да се определи методът, по който ще се извършват вирусологичните изследвания за нюкясълска болест; като има предвид, че за тази цел следва да определят подробностите на процедурата за вземане на проби, извършване на изследванията и тълкуване на резултатите;

като има предвид, че Научният ветеринарен комитет бе консултиран и представи доклада си на 12 декември 1994 г.;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния ветеринарен комитет,

РЕШИ:

Член 1

В приложение на разпоредбите на член 5, параграф 3 от Директива 91/494/ЕИО, вземането на проби и вирусологичното изследване за откриване на нюкясълска болест трябва да отговарят на изискванията от приложението.

Член 2

¹ ОВ L 268, 24. 9. 1991 г., стр. 35.

² ОВ L 340, 31. 12. 1993 г., стр. 39.

Настоящото решение се прилага от 1 април 1995 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 1995 година

За Комисията
Franz FISCHLER
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Вземане на проби

Минимум 60 проби, включващи най-малко 30 трахеални и 30 клоакални тампони за всяко стадо. Вземат се проби от минимум 60 птици. Пробите се вземат 5 дни преди клането и се транспортират охладени, но не замразени до Националната лаборатория по нюкясълска болест за изследване.

2. Обработка на пробите

Могат да се групират максимум пет проби от всеки тип. Тампоните трябва да са поставени в достатъчна антибиотична среда, за да ги покрива изцяло и след разклащане да останат в покой около 2 часа на стайна температура (или по-дълго при температура 4 °C) и след това се избистрят чрез центрофугиране (например 800 до 1000 г за 10 минути).

3. Антибиотична среда

Типичен пример за клоакални тампони е следният: 10 000 единици/ml пеницилин, 10 g/ml стрептомицин, 0,25 mg/ml гентамицин и 5 000 единици/ml микостатин във фосфатен разтвор с рН между 7,2 и 7,4. Разрешава се добавянето на 50 µg/ml окситетрациклин. Съдържанието на тези антибиотици може да бъде 5 пъти по-ниско за трахеалните тампони. При създаването на средата е задължително да се контролира рН след добавянето на антибиотици и да се коригира.

4. Изолиране на вируса в разплодни яйца от кокошки

Инокулират се 0,2 ml от избистрената течност над утайката в алантоидната кухина на поне 4 разплодни кокошки яйца, сложени за инкубация през 8 до 11 дни. В идеалния вариант яйцата трябва да произлизат от стадо, чисто от специфични патогенни органи, но ако това е невъзможно, се разрешава да се използват яйца от стадо, чисто от антитела на вируса на нюкясълската болест. Инокулираните яйца се съхраняват при температура 37 °C и ежедневно се преглеждат. Яйцата, съдържащи мъртви или умиращи ембриони и всички оставащи яйца 4 дни след инокулацията се съхраняват при температура 4 °C и се изследват за хемаглутинация в алантоидната/амниотичната течност.

5. Тълкуване

При отсъствие на хемаглутинация и ако не е изолиран никакъв вирус, тестът се счита отрицателен. Изолирането на вируса на нюкясълската болест означава, че стадото е съмнително и е предмет на разпоредбите на член 4 от Директива

92/66/ЕИО на Съвета¹. Ако вирусът се окаже от ваксинация, вземането на проби и изследването се повтарят.

¹ ОВ L 260, 5. 9. 1992 г., стр. 1.