

# РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1411/1999 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 1999 година

**относно разрешаването на нови добавки и нова употреба на разрешени  
добавки във храните за животни**

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките във храните за животни <sup>1</sup>, последно изменена с Регламент (ЕО) №1245/1999 на Комисията <sup>2</sup>, и по-специално членове 9й и 3 от нея,

- (1) като има предвид, че Директива 70/524/ЕИО предвижда, че може да се разрешат нови добавки или нова употреба на разрешени добавки, вземайки под внимание напредъка в научно-техническото познание;
- (2) като има предвид, че Директива 93/113/ЕО на Съвета от 14 декември 1993 г. относно употребата и търговията с ензими, микроорганизми и техни препарати при храненето на животните <sup>3</sup>, последно изменена с Директива 97/40/ЕО<sup>4</sup>, чрез дерогация от Директива 70/524/ЕИО, даде право на държавите-членки да разрешат временно употребата и търговията с ензими, микроорганизми и техни препарати;
- (3) като има предвид, че проверката на досиетата, предоставени от държавите-членки съгласно член 3 от Директива 93/113/ЕО показва, че определен брой препарати, които принадлежат към групите на ензимите и микроорганизмите могат да бъдат временно разрешени;
- (4) като има предвид, че Научният комитет по хранене на животните даде благоприятно становище по отношение на безвредността на тези препарати;
- (5) като има предвид, че предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по храните за животни,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

## *Член 1*

Препаратите, които принадлежат към групата „ензими” и са изброени в приложение I към настоящия регламент, може да бъдат разрешени, съгласно Директива 70/524/ЕИО, като добавки при храненето на животните, при условията, посочени в цитираното приложение.

## *Член 2*

---

<sup>1</sup> ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1.

<sup>2</sup> ОВ L 150, 17.6.1999 г., стр. 15.

<sup>3</sup> ОВ L 334, 31.12.1993 г., стр. 17.

<sup>4</sup> ОВ L 180, 9.7.1997 г., стр. 21.

Препаратите, които принадлежат към групата „микроорганизми” и са посочени в приложение II към настоящия регламент, може да бъдат разрешени, съгласно Директива 70/524/ЕИО, като добавки при храненето на животните, при условията, посочени в цитираното приложение.

### *Член 3*

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Прилага се от 1 юли 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 1999 година.

*За Комисията:*  
**Franz FISCHLER**  
*Член на Комисията*

# ПРИЛОЖЕНИЕ I

| №  | Добавка                                                                          | Химическа формула, описание                                                                                                                                                                                                                                                                                | Вид или категория животни | Максимална възраст | Мин. Съдържание                                 | Макс. Съдържание  | Други условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Период на разрешение |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                    | Единици активност на kg готова храна за животни |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 6  | Ендо-1,4-бета-ксилаза<br>ЕО 3.2.1.8<br><br>Ендо-1,4-бета-глюканаза<br>ЕО 3.2.1.4 | Препарат на базата на ендо-1,4-бета-ксилаза и 1,4-бета-глюканаза, получено от <i>Humicola insolens</i> (DSM 10442), с минимална активност:<br><br>- В обвивка: 800 FXU <sup>(1)</sup> /g<br>75 FBG <sup>(2)</sup> /g<br>-Микрогранулиран:<br>800 FXU /g<br>75 FBG /g<br>- Течен: 800 FXU /ml<br>75 FBG /ml | Прасета за угодяване      | -                  | 200 FXU<br>19 FBG                               | 800 FXU<br>75 FBG | 1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране<br>2. Препоръчителна доза за kg готов храна за животни:<br>- 400 FXU<br>- 37 FBG<br>3. За употреба при комбинирани храни за животни , богати на нескорбялни полизахариди (предимно арабиноксилани и бета-глюкани), напр.съдържащи над 30% ечемик и/или овес, пшеница | 30.9.1999 г.         |
| 32 | Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза<br>ЕО 3.2.1.6                                         | Препарат на базата на ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получено от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), с минимална активност:<br>- 200 U <sup>(3)</sup> /ml                                                                                                                                         | Пилета за угодяване       | -                  | 100 U                                           | -                 | 1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране<br>2. Препоръчителна доза за kg готов храна за животни: 100 U<br>3. За употреба при комбинирани храни за животни , богати на нескорбялни полизахариди (основно бетаглюкани), напр.съдържащи над 30% ечемик.                                                          | 30.9.1999 г.         |

|    |                                     | 1 200 U/ml                                                                                                                                                                                             | Прасенца                  | Четири месеца      | 400 U                                           | -             | 1.В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране<br>2.Препоръчителна доза за kg готова храна за животни: 400 U<br>3. За употреба при комбинирани храни за животни , богати на нескорбялни полизахариди (основно бетаглюкани), напр.съдържащи над 55% ечемик.                             | 30.9.1999 г.         |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| №  | Добавка                             | Химическа формула, описание                                                                                                                                                                            | Вид или категория животни | Максимална възраст | Мин. Съдържание                                 | Макс. Съдържа | Други условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Период на разрешение |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                        |                           |                    | Единици активност на kg готова храна за животни |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|    |                                     |                                                                                                                                                                                                        | Прасета за угояване       | -                  | 500 U                                           | -             | 1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране<br>2. Препоръчителна доза за kg готов храна за животни: 500 U<br>3. За употреба при комбинирани храни за животни , богати на нескорбялни полизахариди (предимно бета-глюкани), напр.съдържащи над 70% ечемик                           | 30.9.1999 г.         |
| 33 | Ендо-1,4-бета-ксилаза<br>ЕО 3.2.1.8 | Препарат на базата на ендо-1,4-бета-ксилаза, получено от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), с минимална активност:<br>- На прах: 2 000 U /ml <sup>(4)</sup><br>- Течна форма: 5 000 U /ml | Пилета за угояване        | -                  | 500 U                                           | -             | 1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране<br>2. Препоръчителна доза за kg готов храна за животни: от 500 до 2 500 U<br>3. За употреба при комбинирани храни за животни , богати на нескорбялни полизахариди (основно арабиноксилани), напр.съдържащи над 55% пшеница или 60% ръж | 30.9.1999 г.         |

|   |         |                                                      | Кокошки носачки           | -                  | 2 000 U                                         | -                | 1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране<br>2. Препоръчителна доза за kg готов храна за животни: 2 000 U<br>3. За употреба при комбинирани храни за животни , богати на нескорбялни полизахариди (основно арабиноксилани), напр.съдържащи над 35% пшеница | 30.9.1999 г.         |
|---|---------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| № | Добавка | Химическа формула, описание                          | Вид или категория животни | Максимална възраст | Мин. съдържание                                 | Макс. съдържание | Други условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Период на разрешение |
|   |         |                                                      |                           |                    | Единици активност на kg готова храна за животни |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|   |         | - На прах: 4 000 U /g<br>- Течна форма: 10 000 U /ml | Прасенца                  | Четири месеца      | 5 000 U                                         | -                | 1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране<br>2. Препоръчителна доза за kg готов храна за животни: 5 000 U<br>3. За употреба при комбинирани храни за животни , богати на нескорбялни полизахариди (основно арабиноксилани), напр.съдържащи над 45% пшеница | 30.9.1999 г.         |
|   |         | - На прах: 4 000 U /g<br>- Течна форма: 8 000 U /ml  | Прасета за уговяване      | -                  | 4 000 U                                         | -                | 1. В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивост на гранулиране<br>2. Препоръчителна доза за kg готов храна за животни: 4 000 U<br>3. За употреба при комбинирани храни за животни , богати на нескорбялни полизахариди (основно арабиноксилани), напр.съдържащи над 35% пшеница | 30.9.1999 г.         |

- (1) 1FXU е количеството ензим, което освобождава 3,1 микромола редукирна захар (еквивалент на ксилоза) от азо-пшеничен арабиноксилан на минута при рН 6,0 и 50°C.
- (2) 1FBG е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукирна захар (еквивалент на глюкоза) от ечемичен бета-глюкан на минута при рН 6,0 и 50 °C.
- (3) 1U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукирна захар (еквивалент на глюкоза) от ечемичен бета-глюкан на минута при рН 5,0 и 30 °C.
- (4) 1U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редукирна захар (еквивалент на ксилоза) от овесено-шпелтен ксилан на минута при рН 5,3 и 50 °C.

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

| № | Добавка                                | Химическа формула, описание                                                                               | Вид или категория животни | Максимална възраст | Мин. Съдържа ние                                                     | Макс. Съдържа ние   | Други условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Период на разрешение |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   |                                        |                                                                                                           |                           |                    | Брой единици, образуващи колонии (CFU) на kg готова храна за животни |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 1 | Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 | Препарат на базата на Bacillus cereus var. toyoi , съдържащ минимум 1 x 10 <sup>10</sup> CFU на g добавка | Пилета за угодяване       | -                  | 0,2 x 10 <sup>9</sup>                                                | 1 x 10 <sup>9</sup> | В указанията за използване на добавката и премикса, посочете допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране<br><br>Може да се използва в комбинирани храни за животни, съдържащи разрешените кокцидиостатици: натриев монензин, натриев лазалоцид, натриев салиномицин, ампролиум-етопабат, метихлорпиндол-метил бензокват, декоквинат, робенидин, динитолмид, наразин, халофугинон | 30.9.1999 г.         |
|   |                                        |                                                                                                           | Кокошки - носачки         | -                  | 0,2 x 10 <sup>9</sup>                                                | 1 x 10 <sup>9</sup> | В указанията за използване на добавката и премикса, посочете допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.9.1999 г.         |

|  |  |  |        |             |                       |                     |                                                                                                                                              |              |
|--|--|--|--------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  | Телета | Шест месеца | 0,5 x 10 <sup>9</sup> | 1 x 10 <sup>9</sup> | В указанията за използване на добавката и премикса, посочете допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране | 30.9.1999 г. |
|--|--|--|--------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| № | Добавка | Химическа формула, описание | Вид или категория животни | Максимална възраст | Мин. Съдържание                                                      | Макс. Съдържание      | Други условия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Период на разрешение |
|---|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|   |         |                             |                           |                    | Брой единици, образуващи колонии (CFU) на kg готова храна за животни |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|   |         |                             | Говеда за уговяване       | -                  | 0,2 x 10 <sup>9</sup>                                                | 0,2 x 10 <sup>9</sup> | В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, както и устойчивостта на гранулиране<br><br>Количеството <i>Bacillus cereus</i> var. <i>toyoi</i> в дневната дажба не трябва да превишава 1,0 x 10 <sup>9</sup> CFU на 100 kg живо тегло. Добавете 0,2 x 10 <sup>9</sup> CFU за всеки допълнителни 100 kg живо тегло | 30.9.1999 г.         |
|   |         |                             | Зайки за разплод          | -                  | 0,1 x 10 <sup>9</sup>                                                | 5 x 10 <sup>9</sup>   | В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране.<br><br>Може да се използва при комбинирани храни за животни, съдържащи разрешените кокцидиостатици: робенидин                                                                                                                        | 30.9.1999 г.         |

|  |  |  |                    |   |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|--|--|--|--------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  | Зайци за уговяване | - | 0,1 x 10 <sup>9</sup> | 5 x 10 <sup>9</sup> | В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране.<br><br>Може да се използва при комбинирани храни за животни, съдържащи разрешените кокцидиостатици: метихлорпиндол, робенидин, натриев салиномицин | 30.9.1999 г. |
|--|--|--|--------------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| №  | Добавка                                          | Химическа формула, описание                                                                                                                                                                                                                                      | Вид или категория животни | Максимална възраст | Мин. Съдържа                                                         | Макс. Съдържа        | Други условия                                                                                                                                                        | Период на разрешение |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                    | Брой единици, образуващи колонии (CFU) на kg готова храна за животни |                      |                                                                                                                                                                      |                      |
| 12 | <i>Lactobacillus farciminis</i><br>CNCM MA 67/4R | Препарат на базата на <i>Lactobacillus farciminis</i> , съдържащ минимум 1 x 10 <sup>9</sup> CFU на g добавка                                                                                                                                                    | Прасенца                  | Четири месеца      | 1 x 10 <sup>9</sup>                                                  | 1 x 10 <sup>10</sup> | В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране. | 30.9.1999 г.         |
| 13 | <i>Enterococcus faecium</i><br>DSM 10 663        | Препарат на базата на <i>Enterococcus faecium</i> , съдържащ минимум:<br>- На прах и гранулирана форми: 3,5 x 10 <sup>10</sup> CFU на g добавка<br>- В обвивка: 2,0 x 10 <sup>10</sup> CFU на g добавка<br>- Течна форма: 1 x 10 <sup>10</sup> CFU на ml добавка | Прасенца                  | Четири месеца      | 1 x 10 <sup>9</sup>                                                  | 1 x 10 <sup>10</sup> | В указанията за използване на добавката и премикса, посочете температурата на съхранение, допустимата продължителност на съхранение, и устойчивостта на гранулиране. | 30.9.1999 г.         |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                      |                       |                  |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14 | <i>Saccharomyces cerevisiae</i><br>MUCL 39 885 | Препарат на базата на <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ,<br>съдържащ минимум:<br><br>- Форма на прах, сферична и<br>овална гранулирани форми:<br>1 x 10 <sup>9</sup> CFU на g добавка | Прасенца              | Четири<br>месеца | 3 x 10 <sup>9</sup> | 3 x 10 <sup>9</sup> | В указанията за използване на<br>добавката и премикса, посочете<br>температурата на съхранение,<br>допустимата продължителност на<br>съхранение, и устойчивостта на<br>гранулиране.                                                                                                                                                                                                                                     | 30.9.1999 г. |
|    |                                                |                                                                                                                                                                                      | Говеда за<br>угояване |                  | 9 x 10 <sup>9</sup> | 9 x 10 <sup>9</sup> | В указанията за използване на<br>добавката и премикса, посочете<br>температурата на съхранение,<br>допустимата продължителност на<br>съхранение, и устойчивостта на<br>гранулиране.<br><br>Количеството <i>Saccharomyces cerevisiae</i> в дневната дажба не трябва<br>да превишава 1,6 x 10 <sup>10</sup> CFU на 100<br>kg живо тегло. Добавете 3,2 x 10 <sup>9</sup><br>CFU за всеки допълнителни 100 kg<br>живо тегло | 30.9.1999 г. |