

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 1465/2004 НА КОМИСИЯТА

от 17 август 2004 година

относно постоянното разрешение на добавка за влагане във храни за животни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. по отношение на добавките във храните за животни¹, и по-специално член 3 и член 9г, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1) Директива 70/524/ЕИО предвижда, че нито една добавка не може да бъде пусната за употреба, докато за нея не бъде издадено разрешително от страна на Общността. За добавките, упоменати в част II на приложение В към същата тази директива, могат да бъдат издадени разрешителни без ограничение във времето, ако са изпълнени определени условия.

(2) използването на препарата 6-фитаза, произведен от *Aspergillus oryzae* (DSM 11857), беше разрешено за определен период от време, за първи път, за пилета за угодяване, за яйцеснасящи кокошки, за пуйки за угодяване, за прасенца, и за прасета за угодяване, с Регламент (ЕО) 1353/2000 на Комисията², и за свине майки, с Регламент (ЕО) 261/2003 на Комисията³.

(3) бяха предадени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешително без ограничение във времето на валидността, за този препарат. Оценката показва, че са изпълнени условията, предвидени в Директива 70/524/ЕИО за издаване на такова разрешително.

(4) съобразно това, използването на този препарат, както е упоменато в приложението, трябва да бъде разрешено за неограничен период от време.

(5) оценката на този препарат показва, че са необходими определени процедури за да се предпазят работниците от излагане на добавките, заложи в приложенията. Тази защита трябва да се осигури чрез прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за стимулиране подобрения по отношение на безопасността и здравето на работниците по време на работа⁴.

(6) мерките, предвидени в настоящия регламент са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) 1756/2002 (ОВ L 265, 3.10.2002 г., стр. 1.).

² ОВ L 155, 28.6.2000 г., стр. 15.

³ ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр.12.

⁴ ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, които принадлежат към групата на „Ензимите”, както е посочено в приложение I, е разрешен за употреба като добавка за хранене на животните, при условията, заложиени в същото това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 август 2004 година.

За Комисията:
David BYRNE
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЕО номер	Добавка	Химическа формула, описание	Биологичен вид, или категория на животното	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на периода на разрешението
					Активни единици на килограм готова храна за животни			
Ензими								
„Е 1614	6-фитаза ЕС 3.1.3.26	Препарат от 6-фитаза, произведен от <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857), който е с минимална активност от: В твърдо агрегатно състояние: 2 500 FYT (°) за грам В течно агрегатно състояние: 5 000 FYT за грам	Пилета за угодяване	--- --- ---	250 FYT	--- --- ---	1. В упътването за употреба на добавката и премикса, да се посочва температурата за съхранение, максималния период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна доза на килограм готова храна за животни: 500-1000 FYT. 3. За използване в комбинирани храни за животни, които съдържат повече от 0,25% фосфор под формата на фитин.	Без ограничение във времето

⁵ 1 FYT е количеството ензим, което освобождава 1 микромол от неорганичен фосфат за една минута, от натриев фитат, при рН 5,5 и при температура 37 ° по Целзий.

			Яйцеснася щи кокошки	--- --- ---	300 FYT	--- --- ---	1. В упътването за употреба на добавката и премикса, да се посочва температурата за съхранение, максималния период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна доза на килограм готова храна за животни: 450-1000 FYT. 3. За използване в комбинирани храни за животни, които съдържат повече от 0,25% фосфор под формата на фитин.	Без огранич ение във времето
--	--	--	----------------------------	-------------	---------	-------------	---	--

			Пуйки за угояване	--- --- ---	250 FYT	--- --- ---	1. В упу̀тването за употреба на добавката и премикса, да се посочва температурата за съхранение, максималния период на съхранение и стабилността на гранулитe. 2. Препоръчителна доза на килограм готова храна за животни: 500-1000 FYT. 3. За използване в комбинирани храни за животни, които съдържат повече от 0,25% фосфор под формата на фитин.	Без огранич ение във времето
--	--	--	----------------------	-------------	---------	-------------	--	--

			Прасенца	--- --- ---	250 FYT	--- --- ---	1. В упътването за употреба на добавката и премикса, да се посочва температурата за съхранение, максималния период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна доза на килограм готова храна за животни: 500-1000 FYT. 3. За използване в комбинирани храни за животни, които съдържат повече от 0,25% фосфор под формата на фитин. 4. За използване при отбити прасенца, докато станат приблизително 35 килограма.	Без ограничение във времето
--	--	--	----------	-------------	---------	-------------	--	-----------------------------

			Свине за угояване	--- --- ---	250 FYT	--- --- ---	1. В упътването за употреба на добавката и премикса, да се посочва температурата за съхранение, максималния период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна доза на килограм готова храна за животни: 500-1000 FYT. 3. За използване в комбинирани храни за животни, които съдържат повече от 0,25% фосфор под формата на фитин.	Без огранич ение във времето
--	--	--	----------------------	-------------	---------	-------------	---	--

			Свине- майки	--- --- ---	750 FYT	--- --- ---	1. В упътването за употреба на добавката и премикса, да се посочва температурата за съхранение, максималния период на съхранение и стабилността на гранулите. 2. Препоръчителна доза на килограм готова храна за животни: 750-1000 FYT. 3. За използване в комбинирани храни за животни, които съдържат повече от 0,25% фосфор под формата на фитин.	Без огранич ение във времето ”
--	--	--	-----------------	-------------	---------	-------------	---	---