

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 833/2005 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2005 година

относно безсрочното разрешаване употреба на добавки в храните за животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките в храните за животни¹, и по-специално членове 3 и 9, подточка Г, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване в храненето на животните², и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

- (1) Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда издаването на разрешения за употребата на хранителни добавки в храненето на животни.
- (2) член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 определя преходни мерки за заявленията за издаване на разрешителни за хранителните добавки за животни, които се подават съгласно Директива 70/524/ЕИО преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (3) заявленията за издаване на разрешителни за хранителните добавки, изброени в приложенията към настоящия регламент, бяха подадени преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (4) първоначалните становища по тези заявления, както това е предвидено в член 4, параграф 4 на Директива 70/524/ЕИО, бяха изпратени на Комисията преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това тези заявления следва да продължат да бъдат разглеждани в съответствие с член 4 на Директива 70/524/ЕИО.
- (5) употребата на ензимния препарат ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) и ендо-1,4-бета-ксилаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 1 35) и алфа-амилаза, получавана от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) бе временно разрешена за първи път за отбити малки прасенца с Регламент (ЕО) № 2690/1999 на Комисията³. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат

¹ ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1., Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

² ОВ L268, 18.10.2003 г., стр. 29.

³ ОВ L326, 18.12.1999 г., стр. 33.

без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, определени в член 3 А от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложението, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

- (6) употребата на ензимния препарат ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), ендо-1,4-бета- ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 1 35), алфа-амилаза, получавана от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) и полигалактуроноза, получавана от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) бе временно разрешена за първи път за отбити малки прасенца с Регламент (ЕО) № 2690/1999. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, определени в член 3 А от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложението, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.
- (7) употребата на ензимния препарат ендо-1,4-бета- ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) и на субтилизин, получаван от *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) бе временно разрешена за първи път за отбити малки прасенца с Регламент (ЕО) № 1636/1999 на Комисията ⁴. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, определени в член 3 А от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложението, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето
- (8) употребата на ензимния препарат ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) и ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) бе временно разрешена за първи път за прасета за угодяване с регламент (ЕО) № 1636/1999. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, определени в член 3 А от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложението, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.
- (9) употребата на ензимния препарат ендо-1,4-бета-ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) бе временно разрешена за първи път за пилета за угодяване с Регламент (ЕО) № 1411/1999 на Комисията⁵. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, определени в член 3 А от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложението, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

⁴ ОВ L194, 27.7.1999 г., стр. 17.

⁵ ОВ L164, 30.6.1999 г., стр. 56.

- (10) употребата на ензимния препарат ендо-1,4-бета-ксилаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) бе временно разрешена за първи път за пилета за утаяване с Регламент (ЕО) № 418/2001 на Комисията⁶. В подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни. Оценката показва, че са спазени условията, определени в член 3 А от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение. Употребата на този ензимен препарат, както той е специфициран в приложението, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.
- (11) оценката на тези заявления показва, че е необходимо да се предвидят определени процедури, за да бъдат защитени работниците от излагане на вредното въздействие на добавките, посочени в приложенията. Тази защита следва да бъде гарантирана от прилагането на директива 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 година за въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното им място⁷.
- (12) предвидените по силата на настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата като добавки за храненето на животни на препаратите от групата „Ензими”, специфицирани в приложението, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2005 година.

За Комисията:
Markos KYPRIANOU
Член на Комисията

⁶ ОВ L 62, 2.3.2001 г., стр. 3.

⁷ ОВ L183, 29.6.1989 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (ЕО) №1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003, стр. 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
Ензими								
Е 1624	Ендо-1, 3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), ендо-1,4-бета- ксиланаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 1 35) и алфа-амилаза, получавана от <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) с минимално действие от: Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 250 U ⁽¹⁾ /g: Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U ⁽²⁾ /g Алфа-амилаза: 1000U ⁽³⁾ /g.	Малки прасенца (отбити)	-	ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 250 U	-	1.В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2.Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 250 U ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U афа-амилаза: 1000U 3. За употреба в хранителни смеси със съдържание на зърнени храни, богати на скорбяла и на несъдържащи скорбяла полизахариди	Без ограничен ие във времето
	Ендо-1, 4-бета-ксиланаза ЕО 3.2.1.8				ендо-1,4-бета-ксиланаза: 400 U	-		
	Алфа-амилаза 3.2.1.1				афа-амилаза: 1000U	-		

							(предимно арабиноксилани и бета глукани), напр. съдържащи над 35 % ечемик. 4. За употреба при отбити малки прасенца до приблизително тегло 35 kg.
--	--	--	--	--	--	--	--

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимал на възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			
Е 1625	Ендо-1, 3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6 Ендо-1, 4-бета-ксилаза ЕО 3.2.1.8 Алфа-амилаза 3.2.1.1 Полигалактуроназа за ЕО 3.2.1.15	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), ендо-1,4-бета- ксиланаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 1 35), алфа-амилаза, получавана от <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) и полигалактуроназа, получавана от <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) с минимално действие от: Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 150 U ⁽¹⁾ /g; Ендо-1,4-бета-ксилаза: 4000 U ⁽²⁾ /g Алфа-амилаза: 1000U ⁽³⁾ /g. Полигалактуроназа: 25 U ⁽⁴⁾ /g.	Малки прасенца (отбити)	-	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 150 U Ендо-1,4-бета-ксилаза: 4000 U Алфа-амилаза: 1000U Полигалак туроназа: 25 U	- - -	1.В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2.Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 150 U ендо-1,4-бета-ксилаза: 4000 U афа-амилаза: 1000U полигалактуроназа: 25 U 3. За употреба в хранителни смеси със съдържание на зърнени храни, богати на скорбяла и на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно арабиноксилани и бета глукани), напр. съдържащи над 20 %	Без ограничение във времето

ечемик и 35%
пшеница.
4. За употреба при
отбити малки прасенца
до приблизително
тегло 35 kg.

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максим ална възраст	Минимално съдържание	Максимал но съдържан ие	Други условия	Край на срока на разрешите лното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			

Е 1626	Ендо-1, 4-бета-ксилаза ЕО 3.2.1.8 Субтилизин ЕО 3.4.21.62	Препарат от ендо-1,4-бета- ксиланаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), и субтилизин, получаван от <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107) с минимално действие от: Ендо-1,4-бета-ксилаза: 5000 U⁽²⁾/g Субтилизин: 500 U⁽⁵⁾/g.	Малки прасенца (отбити)	-	Ендо-1,4-бета-ксилаза: 5000 U	Субтилизин: 500 U	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-1,4-бета-ксилаза: 5000 U Субтилизин: 500 U 3. За употреба в хранителни смеси със съдържание на над 40% пшеница. 4. За употреба при отбити малки прасенца до приблизително тегло 35 kg.	Без ограничен ие във времето
--------	---	---	-------------------------	---	-------------------------------	-------------------	---	------------------------------

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			

Е 1627	Ендо-1, 3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6 Ендо-1, 4-бета-ксилаза ЕО 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) и ендо-1,4-бета-ксилаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), с минимално действие от: Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 800 U⁽¹⁾/g Ендо-1,4-бета-ксилаза: 800 U⁽²⁾/g .	Прасета за угояване	-	ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 400 U	ендо-1,4-бета-ксилаза: 400 U	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 400 U ендо-1,4-бета-ксилаза: 400 U 3. За употреба в хранителни смеси, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно бета глюкани и арабиноксилани), напр. съдържащи над 65 % ечемик.	Без ограничен ие във времето
--------	--	--	---------------------	---	-----------------------------------	------------------------------	---	--	------------------------------

Е 1628	Ендо-1, 4-бета-ксилаза ЕО 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,4-бета- ксилаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105), с минимално действие от: Прахообразно състояние: Ендо-1,4-бета-ксилаза: 2000 U⁽²⁾/g Течно състояние: Ендо-1,4-бета-ксилаза: 5000 U/ml .	Пилета за угояване	-	ендо-1,4-бета-ксилаза: 500 U	-	1.В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2.Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-1,4-бета-ксилаза:500-2500 U 3. За употреба в хранителни смеси, богати на несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно арабиноксилани), напр. съдържащи над 55 % пшеница или 60% ръж.	Без ограничен ие във времето
--------	--	---	--------------------	---	------------------------------	---	--	------------------------------

Е 1629	Ендо-1, 4-бета-ксилаза ЕО 3.2.1.8 Ендо-1, 3(4)-бета-глюканаза ЕО 3.2.1.6	Препарат от ендо-1,4-бета-ксилаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), с минимално действие от: Ендо-1,4-бета-ксилаза: 5000 U(2)/ml Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 50 U(1)/ml	Пилета за угояване	-	Ендо-1,4-бета-ксилаза: 1250 U	-	Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 12 U	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: Ендо-1,4-бета-ксилаза: 1250 – 2500 U Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 12 - 25 U 3. За употреба в хранителни смеси, богати на не съдържащи скорбяла полизахариди (предимно бета глукани и арабиноксилани), напр. съдържащи над 20 % ечемик и 40% пшеница.	Без ограничен ие във времето
--------	--	--	--------------------	---	-------------------------------	---	---	---	------------------------------

Забележки:

- (1) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (измерени в глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при рН 5.0 и при 30°C.
- (2) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (измерени в ксилозен еквивалент) от ксилан от овесена шпелта на минута при рН 5.3 и при 50°C.
- (3) 1 U е количеството ензим, което хидролизира 1 микромол глюкозидни връзки от неразтворима във вода подложка от полимер на скорбяла с напречни връзки на минута, при рН 6.5 и при 37°C.
- (4) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуциращ материал (измерен в еквиваленти на галактуринова киселина) от поли-D-галактуринова подложка на минута при рН 5.0 и при 40°C.
- (5) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микрограм фенолно съединение (измерено в тирозинов еквивалент) от казеинова подложка на минута, при рН 7.5 и при 40°C.